



LABORATÓRIO LAIPPE LTDA

BULA: Raticida granulado Letal®

Rodenticida dose única

Composição:

Brodifacoum 0,005% (p/p)

Benzoato de denatônio 0,001% (p/p)

Atrativos, conservantes, corantes e inertes q.s.p. 100 g

Modo de usar:

As iscas (sacos plásticos) devem ser colocadas onde os roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis etc. Dependendo do grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, colocar 1 a 2 sacos plásticos em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, os pontos devem distar cerca de 5 a 10 metros um do outro. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Recomenda-se colocar as iscas em caixas porta-iscas, inacessíveis a espécies não alvo. Não colocar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos.

Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas.

Indicações e mecanismo de ação:

Isca granulada Letal, raticida anticoagulante à base de Broadifacoum a 0,005% p/p. destinado ao combate de roedores em residências, indústrias (especialmente alimentícias), prédios públicos, estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de saúde, instalações rurais, armazéns (principalmente estocagem de gêneros alimentícios) veículos de transporte de carga e terrenos baldios. É eficaz contra as principais espécies de roedores domésticos (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus* e *Mus musculus*). Sendo um anticoagulante de dose única Letal age impedindo a coagulação normal do sangue. A morte do roedor ocorre por hemorragias internas e externas, no prazo médio de dois a sete dias após a ingestão do produto.

Conservação:

Conserve a embalagem em local arejado, afastado do fogo e do calor. Conserve a embalagem bem fechada após o uso, mantendo o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias.

Precauções:

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas ou aquários. Durante o manuseio usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos de agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmos usando luvas e sacos de lixo. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.



LABORATÓRIO LAIPPE LTDA

Primeiros socorros:

Em caso de intoxicação procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalada em excesso, remover a pessoa para local arejado. Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, provoque o vômito.

Indicações para uso médico:

Grupo químico: anticoagulante cumarínico, antagonista da vitamina K. Nome comum: Brodifacoum. Ação tóxica: fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito). Tratamento: Sintomático. Se a intoxicação for recente, proceda à lavagem gástrica.

Registro MS nº 3.0425.0081.001- 1

Fabricado por ROGAMA Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 90.821.554/0001-42