



LARVIDIL[®]

Uso Veterinário

**Matabicheira em pó, larvicida,
repelente, antisséptico e cicatrizante**

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS E EQUINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO SETE DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: DOIS DIAS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Cipermetrina	1,0 g
Carbarila	2,0 g
Sulfadiazina	2,0 g
Alúmen	2,0 g
Violeta genciana	1,0 g
Veículo q.s.p.	100,00 g

Indicações:

Para bovinos e equinos:

Tratamento curativo e preventivo contra as bicheiras (miíases), causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax*, presentes em ferimentos de origem traumática ou cirúrgica, como castração, descorna, umbigo de recém-nascido, corte de arame, arranhadura, pisadura, marcações, etc.

Tratamento curativo das feridas de verão em equinos, causadas por larvas de *Habronema spp* e *Draschia spp* (*Habronemose cutânea*).

Tratamento curativo e preventivo contra infecções do carrapato monoxeno do pavilhão auditivo dos equídeos (*Anocentor nitens*).

Apoio na recuperação de feridas como antisséptico, bactericida e adstringente, auxiliando a cicatrização das mesmas, pelo seu efeito de não deixar a ferida úmida, secando-a, eliminando assim o mau cheiro que atrai as moscas.

Modo de usar:

Uso externo: Por polvilhamento nos locais onde estão instaladas as larvas (miíase) ou nos ferimentos, procurando atingir toda sua extensão, cobrindo-os por completo.

Nas infestações por carrapatos no pavilhão auditivo dos equídeos, polvilhar nos locais onde estão mais concentrados.

A aplicação deve ser repetida, quantas vezes forem necessárias, até a completa recuperação da ferida.

Recomendações:

Ao aplicar o produto, usar máscara e luvas.

Precauções de uso:

- Evitar contato do produto com os olhos, nariz, boca e pele, assim como a inalação ou aspiração do produto. Caso isto ocorra, remover o paciente para local arejado, lavar bem as partes atingidas com bastante água e sabão e procurar um médico;

- Não aplicar ou guardar o produto junto de alimentos, medicamentos, produtos de higiene e domésticos;

- Manusear o produto em locais arejados, não administrando-o contra o vento, evitando contato e aspiração das partículas;

- Não lavar embalagens ou jogar restos de pó em açudes, rios, mananciais e não reaproveitá-las;

- Manter o produto em sua embalagem original hermeticamente fechada;

- Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, fora do alcance de crianças e animais domésticos;

- Produto tóxico para abelhas e peixes.



Proibido para gatos

Informações ao médico:

Trata-se de uma associação entre carbamato e piretróide, inibidores de acetilcolinesterase, com ação junto ao sistema nervoso central. Produto hipersensibilizante e irritante das mucosas. Em caso de ingestão acidental ou intoxicação, fazer um tratamento básico: Sulfato de Atropina injetável, PAM, Contrathion.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

Apresentações:

- Frascos plásticos de 20 g e 200 g

- Barricas de 1 kg e 2 kg



CUIDADO VENENO



PROIBIDO PARA GATOS

Proprietário e Fabricante



Laboratório Lappe Ltda.
Rua Nossa Senhora das Graças, nº 100
CEP 33400-000 - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 25.723.388/0001-80
Fone (31) 3689-5500
INDÚSTRIA BRASILEIRA